

Remingtonocetus

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **remingtonoceto** (gen. ***Remingtonocetus***) è un cetaceo estinto, appartenente agli archeoceti. Visse nell'Eocene medio (circa 45 - 43 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in India e in Pakistan.

Indice

Descrizione

Classificazione

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Descrizione

Questo animale era molto differente dagli odierni cetacei. Il corpo doveva essere vagamente simile a quello di una lontra, e il cranio era dotato di un muso stretto e allungato. Lungo oltre due metri, *Remingtonocetus* era più grande, con un rostro più largo e con premolari più grandi di animali simili come *Andrewsiphius* e *Kutchicetus*. Era invece più piccolo e con denti più gracili rispetto a *Dalanistes*. Di *Remingtonocetus* sono note due specie, ***R. harudiensis*** e ***R. domandaensis***, che differiscono principalmente nella morfologia dei molari (Gingerich et al., 2001).

Classificazione

I primi fossili di questo animale (uno scheletro parziale) vennero ritrovati nella formazione Harudi in India, e vennero descritti nel 1975 come una nuova specie del genere *Protocetus* (***Protocetus harudiensis***). Successivamente (Kumar e Sahni, 1986) i fossili vennero riassegnati a un nuovo genere, *Remingtonocetus*, attribuito a una nuova famiglia di cetacei estinti, i Remingtonocetidae. Nel 2001 venne descritta un'altra specie, *R. domandaensis*, sulla base di uno scheletro parziale ritrovato nella formazione Domanda in Pakistan. Sembra che quest'ultima specie fosse più antica e più basale rispetto a *R. harudiensis*.

Bibliografia

- Sahni, Ashok; Mishra, Vijay Prakash (1975). "Lower Tertiary vertebrates from western India". Monograph of the Paleontological Society of India 3: 1–48. ASIN B0007AL8UE. OCLC 3566369.

Remingtonocetus



Cranio di *Remingtonocetus harudiensis*

Stato di conservazione

Fossile

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Classe Mammalia

Ordine Cetacea

Sottordine Archaeoceti

Famiglia Remingtonocetidae

Genere ***Remingtonocetus***

- Kumar, K.; Sahni, A. (1986). "Remingtonocetus harudiensis, new combination, a middle Eocene archaeocete (Mammalia, Cetacea) from western Kutch, India". *Journal of Vertebrate Paleontology* 6 (4): 326–349. doi:10.1080/02724634.1986.10011629. OCLC 4649653943.
- Gingerich, Philip D.; Russell, Donald E. (1990). "Dentition of Early Eocene Pakicetus (Mammalia, Cetacea)". *Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan* 28 (1): 1–20. Retrieved March 2013.
- Bajpai, S.; Thewissen, J. G. M. (1998). "Middle Eocene Cetaceans from the Harudi and Subathu Formations of India". In Thewissen, J. G. M. *The Emergence of Whales. Advances in vertebrate paleobiology*. New York: Plenum Press. pp. 213–233. ISBN 9780306458538. OCLC 300450327. Retrieved March 2013.
- Williams, Ellen M. (1998). "Synopsis of the Earliest Cetaceans". In Thewissen, J. G. M. *The Emergence of Whales. Advances in vertebrate paleobiology*. New York: Plenum Press. ISBN 9780306458538. OCLC 300450327.
- Gingerich, Philip D.; Ul-Haq, Munir; Khan, Intizar Hussain; Zalmout, Iyad S. (2001). "Eocene stratigraphy and archaeocete whales (Mammalia, Cetacea) of Drug Lahar in the eastern Sulaiman range, Balochistan (Pakistan)". *Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan* 30 (11): 269–319. OCLC 742731671. Retrieved February 2013.
- Thewissen, J. G. M.; Williams, E. M.; Roe, L. J.; Hussain, S. T. (2001). "Skeletons of terrestrial cetaceans and the relationship of whales to artiodactyls". *Nature* 413: 277–81. doi:10.1038/35095005. OCLC 118116179. PMID 11565023. Retrieved February 2013.
- Sepkoski, J. John (2002). "A Compendium of Fossil Marine Animal Genera". *Bulletins of American paleontology* 363. OCLC 207130974.
- Geisler, Jonathan H.; Sanders, Albert E. (2003). "Morphological Evidence for the Phylogeny of Cetacea". *Journal of Mammalian Evolution* 10 (1/2): 23–129. OCLC 361831220.
- McLeod, S. A.; Barnes, L. G. (2008). "A new genus and species of Eocene protocetid archaeocete whale (Mammalia, Cetacea) from the Atlantic Coastal plain". In Wang, Xiaoming; Barnes, Lawrence G. *Geology and Vertebrate Paleontology of Western and Southern North America. Science Series, Natural History Museum of Los Angeles County* 41. pp. 73–98. Retrieved February 2013.
- Uhen, Mark D.; Pyenson, Nicholas D.; Devries, Thomas J.; Urbina, Mario; Renne, Paul R. (2011). "New Middle Eocene Whales from the Pisco Basin of Peru". *Journal of Paleontology* 85 (5): 955–969. doi:10.1666/10-162.1. OCLC 4804318567.

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **Remingtonocetus** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Remingtonocetus?uselang=it)

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Remingtonocetus*, su *Fossilworks.org*.

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Remingtonocetus&oldid=111362622"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 10 mar 2020 alle 17:34.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.